

# Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi

*by* Dewi Elfidasari

---

**Submission date:** 04-Aug-2020 05:34AM (UTC+0000)

**Submission ID:** 1365764303

**File name:** AL\_AZHAR\_SAINTEK\_3\_2\_\_SEPT2015\_kualitas\_air\_Situ\_Lebak\_Wangi.pdf (478.78K)

**Word count:** 4148

**Character count:** 24975

## Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi

Dewi Elfidasari<sup>1</sup>, Nita Noriko<sup>2</sup>, Yunus Effendi<sup>3</sup>, Riris Lindiawati Puspitasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> <sup>8</sup> Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia  
Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

Penulis untuk korespondensi/ E-mail: [d\\_elfidasari@uai.ac.id](mailto:d_elfidasari@uai.ac.id)

**Abstrak** - Situ Lebak Wangi merupakan situ yang berada di daerah Bogor, dan awalnya dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air saat musim hujan untuk meningkatkan persediaan air tanah. Saat ini, Situ Lebak Wangi dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan kualitas baik fisik, kimia dan biologi perairan situ. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas fisik, kimia dan biologi perairan Situ Lebak Wangi agar diperoleh informasi mengenai kualitas perairannya sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya nilai penting konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan situ tersebut. Hasil pengukuran sifat fisik dan kimia air menunjukkan bahwa suhu di perairan Situ Lebak Wangi masih memenuhi baku mutu air kelas 1, nilai total padatan terlarut perairan Situ masih di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan, nilai kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 67,17 – 80,83 cm dengan nilai rata-rata 74,46 cm, nilai pH perairan danau lebih rendah dari perairan sungai, yaitu berkisar antara 6,60–8-80. Pengukuran DO menunjukkan bahwa di perairan danau konsumsi oksigennya lebih tinggi, sedangkan hasil BOD5 menunjukkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi sudah tercemar oleh bahan organik mudah urai (BOD5). Nilai daya hantar listrik berkisar antara 112,0 – 118,0  $\mu\text{hos/cm}$ . Hasil analisa kualitas air Situ Lebak Wangi secara keseluruhan menunjukkan bahwa perairan tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai air baku, karena mengandung bakteri patogen Salmonella-Shigella yang merupakan penyebab thypus dan kolera.

**Keata Kunci** - kualitas fisik, kimia dan biologi; Situ Lebak Wangi; Perairan; Baku mutu air

**Abstract** - Situ Lebak Wangi is a place located in the Bogor area, and was originally used as a water reservoir during the rainy season to increase groundwater supply. Currently, Situ Lebak Wangi is used as a waste disposal site by the community. This can lead to changes in the quality of both physical, chemical and biological waters there. Therefore, research on the physical, chemical and biological qualities of waters of Situ Lebak Wangi to obtain information about the quality of the waters so that it can be socialized to the community around the importance of conservation, management and utilization of the site. The result of measurement of physical and chemical properties of water shows that the temperature in Situ Lebak Wangi waters still meet the water quality standard class 1, the total dissolved solids of waters Situ is still below the required quality standard threshold, the brightness value in Situ Lebak Wangi waters ranges between 67, 17 - 80.83 cm with an average rating of 74.46 cm, the pH value of the lake waters lower than river waters, which ranged from 6.60-8-80. Measurements of DO indicate that in lake waters oxygen consumption is higher, whereas BOD5 results show that waters Situ Lebak Wangi already contaminated by organic material easily explained (BOD5). The electrical conductivity values range from 112.0 - 118.0  $\mu\text{hos/cm}$ . The result of Situ Lebak Wangi water quality analysis as a whole shows that the water is not feasible to serve as raw water, because it contains Salmonella-Shigella pathogen bacteria which is the cause of thypus and cholera.

**Keywords** - physical quality, chemistry and biology, Situ Lebak Wangi, Waters, Water quality standards

## PENDAHULUAN

Situ Lebak Wangi merupakan salah satu situ yang berada di daerah Bogor. Situ ini awalnya dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air di saat musim hujan dan sebagai peningkat ketersediaan air tanah. Situ Lebak Wangi juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah oleh masyarakat. Akibat dari pemanfaatan yang berlebihan dan pengelolaan yang kurang tepat Situ Lebak Wangi saat ini mengalami pendangkalan karena dijadikan perumahan dan lahan pertanian (Sriyono, 2013). Survei awal memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar situ berupa bertambahnya jumlah rumah, area pertanian, restoran dan bengkel serta budidaya perikanan dengan karamba. Selain itu, terjadi pula kemerosotan debit air akibat sedimentasi.

Adanya aktivitas masyarakat di Situ Lebak Wangi diduga menyebabkan terjadinya perubahan kualitas baik fisik, kimia dan biologi pada perairan situ. Perubahan tersebut disebabkan adanya masukan beban dari limbah senyawa organik dan non organik, serta kontaminasi dari *septic tank* rumah warga sekitar Situ Lebak Wangi yang umumnya mengandung bakteri patogen, khususnya kandungan bakteri total koli dan *E.coli (fecal coli)* dan dapat membahayakan kesehatan. Masuknya limbah juga dapat menyebabkan *blooming algae* dan mengubah faktor fisik dan kimia lingkungan perairan.

Perubahan kualitas perairan tersebut menyebabkan penurunan kualitas perairan tersebut tidak sesuai lagi dengan air baku kelas 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan pengujian secara fisik kimia dan biologi pada air di perairan Situ Lebak Wangi untuk menentukan kualitas air di perairan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menentukan kualitas fisik, kimia dan biologi air perairan Situ Lebak Wangi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Manfaat yang dapat diberikan berupa informasi mengenai kualitas air di Situ Lebak Wangi kepada masyarakat di sekitar kawasan tersebut sehingga dapat dipertimbangkan cara pengelolaan dan pemanfaatan situ tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Situ merupakan daerah cekungan seperti danau yang dapat menampung air. Tidak hanya sebagai sumber air, situ juga berfungsi sebagai pengendali banjir, sebagai resapan untuk meningkatkan ketersediaan air tanah dan perikanan. Pemanfaatan situ secara tidak langsung juga telah dilakukan, yaitu sebagai tempat pariwisata dan rekreasi (Yazwar, 2009).

Situ Lebak Wangi adalah salah satu situ yang berada di daerah Bogor (Gambar 1). Situ ini terletak di Desa Pamegarsari RT 02/01, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Pemanfaatan yang berlebihan dan pengelolaan yang kurang baik membuat keadaan Situ Lebak Wangi memprihatinkan (Sriyono, 2013).



Gambar 1. Situ Lebak Wangi (dok.Pribadi, 2014).

### Faktor Fisik-Kimia Perairan

#### Suhu

Pengukuran suhu merupakan parameter yang penting dalam perairan. Menurut hukum Van't Hoff's kenaikan suhu sebesar 10°C pada kisaran suhu yang masih ditolerir akan meningkatkan aktivitas fisiologis dari suatu organisme meningkat 2-3 kali lipat (Barus, 2004). Suhu pada perairan disebabkan oleh intensitas cahaya matahari, kanopi dari vegetasi sekitar perairan serta pertukaran panas antara air dengan udara di sekelilingnya. Kisaran suhu untuk organisme perairan adalah sekitar 20-30°C (Sitorus, 2009). Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan kelarutan oksigen menurun di dalam air (Haslam, 1995).

#### Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman merupakan salah satu faktor pembatas suatu perairan. Perairan umumnya memiliki kisaran tertentu untuk hidup yaitu, netral atau berada pada keadaan asam lemah hingga basa lemah (pH 7-8,5). Semakin rendah pH suatu perairan maka semakin tinggi mobilitas logam berat, sedangkan semakin tinggi pH perairan menyebabkan keseimbangan ammonium dan ammoniak dalam air terganggu (Barus, 2001).

#### Kandungan Oksigen Terlarut (DO)

Kandungan oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut penting bagi organisme perairan terutama respirasi. Proses fotosintesis dari fitoplankton yang menghasilkan oksigen dan difusi dari udara akan mempengaruhi kandungan oksigen terlarut. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan oksigen adalah suhu, laju fotosintesis dan adanya zat pencemar lainnya. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan kenaikan suhu dan meningkat seiring dengan penurunan suhu (Barus, 2001).

#### Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD<sub>s</sub>) dan Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)

Kebutuhan oksigen biologis atau *Biological Oxygen Demand* (BOD) merupakan jumlah oksigen yang diperoleh suatu mikroorganisme aerobik dalam penguraian senyawa organik, yang diukur pada suhu 20°C. Berdasarkan hasil penelitian, proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dapat dilakukan selama 5 hari dengan persentase senyawa

organik yang diuraikan mencapai kurang lebih 70%, sehingga pengukuran yang umum dilakukan adalah pengukuran selama 5 hari (BOD<sub>5</sub>) (Barus, 2001).

Pengukuran BOD didasarkan kepada kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik, artinya hanya terdapat substansi yang mudah diuraikan secara biologis seperti senyawa yang umumnya terdapat dalam limbah rumah tangga (Barus, 2001). Menurut Brower *et al.* (1990), nilai konsentrasi BOD menunjukkan suatu kualitas perairan yang masih tergolong baik dimana apabila konsumsi O<sub>2</sub> selama periode 5 hari sampai 5 mg/l O<sub>2</sub>, dan apabila konsumsi O<sub>2</sub> berkisar antara 10 mg/l – 20 mg/l, maka tingkat pencemaran oleh materi organik tinggi dan untuk air limbah nilai BOD umumnya lebih besar dari 100 mg/l.

#### Kebutuhan oksigen kimiawi

atau *Chemical Oxygen Demand* (COD) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi limbah dalam air melalui reaksi kimia (Wardhana, 2004). Perairan yang memiliki nilai COD kurang dari 20mg/L termasuk perairan tidak tercemar. Nilai COD untuk perairan yang tercemar yaitu, lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industry dapat mencapai 60.000 mg/L (Effendi, 2003).

#### Total Padatan Terlarut (TDS)

Total padatan terlarut atau *Total Dissolved Solid* (TDS) merupakan bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring milipore dengan pori 0,45 µm (Sitorus, 2009). Padatan ini dapat berupa senyawa-senyawa anorganik dan organik yang terlarut dalam air, mineral dan garam-garamnya. Nilai TDS berhubungan dengan kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan merupakan kemampuan penetrasi cahaya matahari hingga kedalaman tertentu. Nilai ini penting untuk mengetahui kedalaman tertentu air yang memungkinkan terjadinya proses fotosintesis (Suin, 2002).

#### Faktor Biologi Perairan

##### Plankton

Plankton merupakan organisme baik tumbuhan maupun hewan yang hidup secara mengapung, mengambang atau melayang di dalam air. Plankton memiliki kemampuan renang yang terbatas sehingga selalu terbawa oleh arus air

(Nontji 2006). Distribusi plankton sangat dipengaruhi oleh dayagerak air, seperti arus dan lainnya (Nybakken 1992).

Secara fungsional membagi plankton atas empat jenis. Zooplankton atau disebut juga plankton hewani yang umumnya berukuran 0,2-2mm. Jenis plankton ini bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Keberadaannya dipengaruhi oleh fitoplankton sebagai makanannya. Fitoplankton atau dikenal sebagai plankton nabati. Plankton berukuran 2-200 $\mu$ m dan bersifat fotoautotrof. Fitoplankton merupakan produsen pada ekosistem perairan. Bakterioplankton merupakan bakteri yang hidup sebagai plankton. Berukuran < 1 $\mu$ m, tidak berklorofil dan berperan sebagai daur hara dalam ekosistem perairan. Jenis plankton yang terakhir adalah virioplankton, berukuran < 0,2 $\mu$ m. Virioplankton menjadikan biota plankton lain sebagai inangnya (Nontji, 2006).

Plankton dalam perairan memegang peranan penting selain sebagai produsen utama. Plankton juga dapat dijadikan sebagai bioindikator atau penentuan kualitas perairan karena plankton mempunyai lingkungan hidup yang sempit dan merespon dengan cepat saat terjadi perubahan pada lingkungan. Salah satu contoh jenis plankton yang menjadi bioindikator terjadinya eutrofikasi adalah *Myrocystis* (Belinger & Sige, 2010).

### 6 Coliform

*Coliform* merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan dan produk-produk susu. Coliform sebagai suatu kelompok bakteri dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, Gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. Adanya bakteri Coliform di dalam makanan/minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Suriawiria, 2008)

Bakteri *Coliform* dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, fekal dan non fekal. Diantaranya kelompok fekal ini adalah *E. coli*.

23

*E. coli* merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau manusia (Irianto, 2006). Keberadaan *E. coli* pada air menunjukkan bahwa air tersebut pernah terkontaminasi feces dan mungkin dapat mengandung patogen usus (Servals dan Pierre, 2007). Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan bakteri *E. coli* harus nol dalam 100 ml. Kelompok Coliform non-fekal diantaranya, *Enterobacter aerogenes* (Suriawiria, 2008).

### Penentuan Jumlah Coliform

Jumlah *Coliform* dalam pemeriksaan kualitas air dapat diketahui menggunakan metode MPN (*Most Probable Number*). Metode MPN menggunakan medium cair di dalam tabung reaksi, dimana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif yang ditumbuhi oleh jasad renik setelah diinkubasi pada suhu tertentu. Pengamatan tabung positif terbaik yaitu untuk jasad renik pembentuk gas. Setiap perlakuan pada umumnya digunakan tiga atau lima seri tabung. Lebih banyak tabung yang digunakan menunjukkan ketelitian yang lebih tinggi (Pelzccar dan Chan, 1988).

35

### METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2014 di Situ Lebak Wangi – Parung Kabupaten Bogor. Pembuatan bahan percobaan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Prodi Biologi Universitas Al-Azhar Indonesia.

Pengambilan sampel air danau dilakukan di 6 titik saat pagi hari (pukul 07.00 – 09.00) dengan 3 ulangan. Posisi pengambilan sampel air ditandai dengan menggunakan alat GPS. Pengambilan sampel menggunakan botol winkler. Botol dimasukkan perlahan ke dalam air. Posisi mulut botol berlawanan dengan arah aliran air sehingga air dapat masuk ke dalam botol tanpa adanya gelembung udara. Botol disimpan dan diberi label untuk analisa fisika dan kimia air danau. Sampel untuk analisis mikroba dilakukan dengan cara mengambil langsung air danau ke dalam botol sampel steril dan segera ditutup rapat lalu disimpan di *cool box*.

### Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia

Sampel air yang disimpan di Botol Winkler segera diukur oksigen terlarut dengan meter, suhu air dengan termometer, nilai pH dengan pH meter digital, zat padat terlarut dengan TDS meter, dan daya hantar listrik dengan *Conductivity meter*. Kecerahan air danau dan intensitas cahaya diukur langsung di danau dengan cakra Secchi dan lux meter. Kebutuhan oksigen biokimia (BOD) diukur dengan menghitung selisih nilai DO setelah 5 hari penyimpanan pada suhu 4°C.

### Pembuatan Media

Media dibuat sesuai takaran yang tertera di botol untuk media *Plate Count Agar* (PCA), *Mc Conkey Agar*, *Escherichia coli* Mug Agar, *Salmonella-Shigella Agar* (SSA), *Potatoes Dextrose Agar* (PDA) Media tersebut dilarutkan dalam akuades dan dipanaskan dengan menggunakan penangas air sampai homogen. Kemudian semua media, kecuali A, disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah itu, media dituang ke dalam cawan petri dan dibiarkan memadat.

### Pengukuran Kualitas Mikrobiologi

Sampel air danau dari ke-6 titik diencerkan dengan menggunakan larutan fisiologis (NaCl 0,85%) hingga pengenceran ke-10. Setelah itu, sebanyak 0,1 ml diinokulasikan ke media uji dan disebar secara merata dengan menggunakan batang L. Setelah itu, diinkubasi di suhu ruang selama 24 jam dan dihitung jumlah koloninya untuk mengetahui jumlah total mikroba. Khusus, untuk pengukuran bakteri *Salmonella-Shigella*, pengenceran yang ditanam adalah ke-0 sampai dengan ke-3.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kualitas Fisika dan Kimia Air

#### Suhu air

Hasil pengukuran suhu pada lokasi penelitian secara keseluruhan tidak memperlihatkan variasi yang besar, bahkan relatif stabil yaitu berkisar antara 29,2–30,2°C, dengan nilai rata-rata 29,6 °C (Gambar 3). Melihat keadaan suhu di daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi suhu di perairan Situ Lebak Wangi masih memenuhi baku mutu air kelas 1. Dengan demikian, perairan Situ Lebak


Wangi dapat digunakan sebagai sumber air baku air minum. Suhu air mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan biota perairan, terutama dalam proses metabolisme. Kenaikan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, namun di lain pihak juga mengakibatkan turunnya kelarutan oksigen dalam air. Oleh karena itu, maka pada kondisi tersebut organisme akuatik seringkali tidak mampu memenuhi kadar oksigen terlarut untuk keperluan proses metabolisme dan respirasi (Effendi, 2003).



Gambar 2. Sebaran nilai rata-rata suhu di perairan Situ Lebak Wangi.

#### Zat Padat Terlarut (TDS)


Hasil pengukuran total padatan terlarut (TDS) di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 53,67 – 58,67 mg/l dengan rata-rata 56,78 mg/l (Gambar 4). Baku mutu kualitas air kelas 1 berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 untuk total padatan terlarut maksimum 1000 mg/l. Nilai total padatan terlarut perairan danau masih di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Dengan demikian, perairan Situ Lebak Wangi masih layak digunakan sebagai sumber air baku air minum.



Gambar 3. Sebaran nilai rata-rata zat padat terlarut (TDS) di perairan Situ Lebak Wangi.

**Kecerahan air**


33 ai kecerahan suatu perairan berhubungan erat dengan penetrasi cahaya matahari ke dalam badan air. Cahaya matahari akan membantu proses terjadinya fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen terlarut yang merupakan faktor penting dalam kehidupan akuatik. Nilai kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 67,17 – 80,83 cm dengan nilai rata-rata 74,46 cm (Gambar 5). Nilai kecerahan antar stasiun penelitian mempunyai variasi yang relatif kecil dan hampir menyebar merata pada setiap stasiun. Adanya perbedaan nilai kecerahan ini diduga karena pengaruh dari kuantitas maupun kualitas air dari daerah aliran sungai yang membawa partikel-partikel bahan organik ke perairan danau.



Gambar 4. Sebaran nilai rata-rata kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi.

**27 air**

Hasil pengukuran pH di perairan Situ Lebak Wangi memperlihatkan bahwa nilai pH perairan danau lebih rendah dari perairan sungai, yaitu berkisar antara 6,60–8,80, dengan nilai rata-rata 7,82 (Gambar 5). Hal ini diduga akibat adanya pengaruh buangan limbah penduduk yang masuk ke perairan danau. Limbah atau sampah tersebut mengandung berbagai macam senyawa kimia yang bersifat basa seperti buangan deterjen, yang dapat meningkatkan nilai pH di perairan. Namun demikian, secara keseluruhan pH perairan danau masih berada pada kisaran yang aman sebagai sumber air baku air minum berdasarkan ambang batas baku mutu kualitas air kelas 1 yang mensyaratkan nilai pH antara 6–9. Dengan demikian, pH perairan Situ Lebak Wangi dapat mendukung kehidupan yang ada di dalamnya dan dapat dipergunakan sebagai sumber air baku air minum.



41 Gambar 5. Sebaran nilai rata-rata pH di perairan Situ Lebak Wangi.

**1**


Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen dan ion-ion. Dari aktivitas biologi dihasilkan gas CO<sub>2</sub> yang merupakan hasil respirasi. Gas ini akan membentuk ion buffer atau penyangga untuk menjaga kisaran pH di perairan agar tetap stabil (Pescod, 1978).

**40 larutan Oksigen (DO)**

Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 4,81 – 6,20 mg/l, dengan nilai rata-rata 5,28 mg/l (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa di perairan danau konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan di badan perairan danau, terutama kegiatan budidaya ikan dan sampah atau sisa makanan. Kandungan oksigen terlarut di perairan danau tidak melebihi baku mutu air kelas 1 sebagai sumber air baku air minum yang mensyaratkan kandungan oksigen terlarut > 6 mg/l. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan danau sudah mulai tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai karena nilainya sudah mendekati baku mutu. Hal ini menunjukkan bahwa perairan danau Situ Lebak Wangi layak digunakan sebagai sumber air baku air minum.

Penyebab kandungan oksigen terlarut di titik sampling 1 di atas ambang batas baku mutu diduga karena padatnya pemanfaatan lahan pada ekosistem perairan danau terutama untuk pertanian, sehingga dekomposisi bahan organik menjadi bahan anorganik oleh mikroorganisme pengurai juga semakin


tingkat. Selain itu, menurunnya kandungan oksigen terlarut ini juga disebabkan oleh banyaknya limbah organik yang berasal dari limbah domestik dari daerah sempadan danau.



Gambar 6. Sebaran nilai rata-rata kandungan oksigen terlarut di perairan Situ Lebak Wangi.

### BOD5

BOD5 merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberadaan bahan organik di perairan. Hal ini disebabkan BOD5 dapat menggambarkan jumlah bahan organik yang dapat diuraikan secara biologis, yaitu jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecahkan atau mengoksidasi bahan-bahan organik menjadi karbon dioksida dan air. Nilai BOD5 yang tinggi menunjukkan semakin besarnya bahan organik yang terdekomposisi menggunakan sejumlah oksigen di perairan. Adapun sebaran nilai rata-rata BOD5 di perairan Situ Lebak Wangi diperlihatkan pada Gambar 7. Gambar 7 mempresentasikan bahwa nilai BOD5 di perairan danau berkisar antara 1,6-3,1 mg/l, dengan rata-rata 2,4 mg/l. Berdasarkan baku mutu air kelas 1, nilai BOD5 yang dipersyaratkan < 2 mg/l. Dengan demikian, disimpulkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi sudah tercemar oleh bahan organik mudah urai (BOD5) dan tidak layak dipergunakan sebagai sumber air baku air minum. Tingginya kadar BOD5 tersebut terutama disebabkan oleh padatnya pemanfaatan areal di sekitar sungai untuk permukiman penduduk. Hal ini akan mengintroduksi limbah domestik masuk ke perairan danau.




Gambar 7. Sebaran nilai rata-rata BOD5 di perairan Situ Lebak Wangi.

Pada perairan yang relatif tenang (*stagnant*) seperti Situ Lebak Wangi, limbah organik yang masuk dimungkinkan akan mengendap dan terakumulasi pada substrat dasar perairan, sehingga proses dekomposisi meningkat dan menyebabkan kandungan oksigen terlarut menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggoro (1996) yang menyatakan bahwa menumpuknya bahan pencemar organik di perairan akan menyebabkan proses dekomposisi oleh organisme pengurai juga semakin meningkat, sehingga konsentrasi BOD5 juga meningkat. Di samping itu menurut Canter and Hill (1979), peningkatan nilai BOD5 merupakan indikasi menurunnya kandungan oksigen terlarut di perairan karena adanya aktivitas organisme pengurai.

### Daya Hantar Listrik (Conductivity)

Untuk nilai daya hantar listrik (Conductivity), kondisi air danau Situ Lebak Wangi yang diteliti sebanding dengan kandungan TDS yang mana pada tingkat nilai TDS tinggi, nilai daya hantar listrik juga tinggi (Gambar 8). Hasil pengukuran daya hantar listrik di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 112,0 – 118,0  $\mu\text{hos/cm}$ , dengan nilai rata-rata rata-rata 114,6  $\mu\text{hos/cm}$ . Dalam hal ini tidak ada acuan mengenai persyaratan baku mutu yang ditentukan. Daya hantar listrik sendiri merupakan gambaran mengenai banyaknya kandungan garam-garam terlarut yang mana semakin tinggi ion-ion garam-garam yang ada akan semakin efektif sebagai konduktor dalam mengantarkan arus listrik.





Gambar 8. Sebaran nilai rata-rata daya hantar listrik di perairan Situ Lebak Wangi.

**Kualitas Mikrobiologi**

Bakteri *coliform* dapat digunakan sebagai indikator adanya pencemaran feces atau kotoran manusia dan hewan di dalam perairan. Golongan bakteri ini umumnya terdapat di dalam feces manusia dan hewan. Oleh sebab itu keberadaannya di dalam air tidak dikehendaki, baik ditinjau dari segi kesehatan, estetika, kebersihan maupun kemungkinan terjadinya infeksi yang berbahaya. Beberapa jenis penyakit dapat ditularkan oleh bakteri

*coliform* melalui air, terutama penyakit perut seperti tipus, kolera dan disentri (Suriawiria, 1993). Hasil analisis kandungan bakteri *coliform* di perairan danau berkisar antara  $1 \times 10^4 - 1 \times 10^7$  cfu/ml, yang menunjukkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi mengandung bahan organik yang cukup tinggi sebagai sumber kehidupan mikroorganisme. Suriawiria (1993) menyatakan bahwa kehadiran mikroba patogen di dalam air akan meningkat jika kandungan bahan organik di dalam air cukup tinggi, yang berfungsi sebagai tempat dan sumber kehidupan mikroorganisme. Kualitas air Situ Lebak Wangi secara keseluruhan tidak layak untuk dijadikan sebagai air baku, didukung oleh hasil penelitian yang memperlihatkan adanya jenis bakteri patogen Salmonella- Shigella yang merupakan penyebab tifus dan kolera.

Tabel 1. Analisis mikroba perairan Situ Lebak Wangi.

Total	Titik sampling					Rata-rata	Baku mutu (CFU/ml)
	1	2	3	4	5		
22. coli (CFU/ml)	$1 \times 10^6$	$1 \times 10^6$	$1 \times 10^4$	$1 \times 10^4$	$2 \times 10^{12}$	$4 \times 10^{11}$	$1 \times 10^3$
E.coli (CFU/ml)	$3.3 \times 10^3$	$8.8 \times 10^5$	$1 \times 10^3$	$1 \times 10^3$	$4.9 \times 10^5$	$2.8 \times 10^5$	0
Coliform (CFU/ml)	$1 \times 10^5$	$1 \times 10^7$	$1 \times 10^4$	$1 \times 10^5$	$1.4 \times 10^5$	$2.1 \times 10^6$	$1 \times 10^3$
SS (CFU/ml)	$3.3 \times 10^3$	$8.8 \times 10^5$	$1 \times 10^3$	$1 \times 10^3$	$4.9 \times 10^5$	$2.8 \times 10^5$	0
Jamur (propagul/ml)	$1.1 \times 10^2$	$1.6 \times 10^2$	$1.8 \times 10^2$	$4.5 \times 10^1$	$2.5 \times 10^2$	$1.5 \times 10^2$	-

**Fitoplankton**

Hasil peamatan fitoplankton yang dilakukan didapatkan bahwa pada setiap stasiun diperoleh jumlah jenis yang berbeda. Stasiun 1 ditemukan 15 jenis fitoplankton, sedangkan stasiun 2, 3 dan 4 ditemukan 9, 22 dan 14. Plankton dalam perairan memegang peranan penting selain sebagai produsen utama. Plankton juga dapat dijadikan sebagai bioindikator atau penentuan kualitas perairan karena plankton mempunyai lingkungan hidup yang sempit dan merespon dengan cepat saat terjadi perubahan pada lingkungan. Salah satu contoh jenis plankton yang menjadi

bioindikator terjadinya eutrofikasi adalah *Mycrocystis* (Belinger&Sige, 2010).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pengukuran kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi, perairan Situ Lebak Wangi tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dana penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pengembangan dan Penelitian (LP2M) Universitas Al Azhar Indonesia.

### REFERENCE

- [1] Barus, T.A. 2001. *Pengantar Limnologi: Studi Tentang Ekosistem Air Daratan*. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan IPA. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- [2] Barus, T.A. 2004. *Pengantar Limnologi: Studi Tentang Ekosistem Sungai dan Danau*. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan IPA. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- [3] Brower, J.E., Jerrold, H.Z. & Car, I.N.V.E. 1990. *Field and Laboratory Methods for General Ecology 3th Edition*. Wm. C. Brown Publisher. New York.
- [4] Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Kanisius, Yogyakarta.
- [5] Fardiaz, S. 1993. *Analisis Mikrobiologi Pangan*. PAU. IPB.
- [6] Haslam, S.M. 1995. *River Pollution, An Ecological Perspective*. Belhaven Press. London.
- [7] Irianto, K. 2006. *Mikrobiologi: Menguak Dunia Mikroorganisme*. Yrama Widya. Bandung.
- [8] Pelczar, M. J. & E. C. S. Chan. 1986. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Diterjemahkan oleh : Hadioetomo, R. S., T. Imas, S. S. Tjitrosomo dan S. L. Angka. UI Press. Jakarta.
- [9] Servais & Pierre. 2007. *Fecal Bacteria In The Rivers Of The Seine Drainage Network (France): Sources, Fate and Modeling*. Université Libre de Bruxelles. Bruxelles.
- [10] Sitorus, M. 2009. Hubungan Nilai Produktivitas Primer Dengan Konsentrasi Klorofil *a* dan Faktor Fisik Kimia Di Perairan Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. *Tesis*. Program Studi Biologi. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara.
- [11] Sriyono, E. 2013. Penelusuran Banjir dan Kapasitas Pelimpah Situ Lebak Wangi, Bogor Jawa Barat. *Jurnal Teknik*. 2(3): 84-91.
- [12] Suin, N. M. 2002. *Metode Ekologi*. Universitas Andalas. Padang.
- [13] Suriawiria, U. 2008. *Mikrobiologi Air*. PT. Alumni. Bandung.
- [14] Wardhana, W.A. 2004. *Dampak Pencemaran Perairan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [15] Yazwar. 2008. Keanekaragaman Plankton Berdasarkan dan Keterkaitannya Dengan Kualitas Air Di Prapat Danau Toba. *Tesis*. Program Studi Biologi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

# Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	1%
2	<a href="https://jurnalteknik.janabadra.ac.id">jurnalteknik.janabadra.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Yulizar Yusuf, Hermansyah Aziz, Pepi Rahmi Sari Jaslia. "PENGARUH PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU TERHADAP SIFAT KIMIA AIR RENDAMAN (pH, TDS DAN KESADAHAN TOTAL) DAN SIFAT KUAT TEKAN MORTAR SEMEN PCC PADA PERENDAMAN AIR LAUT", Jurnal Zarah, 2017 Publication	1%
4	<a href="https://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://lilyutami10.blogspot.com">lilyutami10.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repository.akfar-isfibjm.ac.id">repository.akfar-isfibjm.ac.id</a> Internet Source	1%

7	<p>MARIA MAGDALENA KOLO. "Penentuan Status Mutu dan Beban Pencemaran Air Kali Dendeng Kota Kupang", Jurnal Saintek Lahan Kering, 2019</p> <p>Publication</p>	1%
8	<p>lp2m.uai.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	1%
9	<p>harry-vht.blogspot.com</p> <p>Internet Source</p>	1%
10	<p>Submitted to Lambung Mangkurat University</p> <p>Student Paper</p>	1%
11	<p>Liss Dyah Dewi Arini, Rahaju Muljo Wulandari. "Kontaminasi Bakteri Coliform pada Saus Siomai dari Pedagang Area Kampus di Surakarta", Biomedika, 2018</p> <p>Publication</p>	1%
12	<p>Rara Diantari, Abdullah Aman Damai, Leoni Dian Pratiwi. "EVALUASI KESESUAIAN PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA IKAN BETUTU <i>Oxyeleotris marmorata</i> (BLEEKER, 1852) DI DESA RANTAU JAYA MAKMUR SUNGAI WAY PEGADUNGAN KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018</p> <p>Publication</p>	<1%

13 Yonky Dwi Putra, Laili Fitria. "UJI TOKSISITAS AKUT LIMBAH CAIR RUMAH MAKAN TERHADAP IKAN MAS (Cyprinus Carpio L.)", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2015  
Publication <1%

---

14 [matildachristinaword.wordpress.com](http://matildachristinaword.wordpress.com)  
Internet Source <1%

---

15 Submitted to Universitas Putera Batam  
Student Paper <1%

---

16 [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)  
Internet Source <1%

---

17 [catatanmasrey.blogspot.com](http://catatanmasrey.blogspot.com)  
Internet Source <1%

---

18 [taufik-ardiyanto.blogspot.com](http://taufik-ardiyanto.blogspot.com)  
Internet Source <1%

---

19 Bambang Susanto, Ibnu Rusdi, I Nyoman Adiasmara Giri. "OPTIMALISASI PEMELIHARAAN YUWANA ABALON ( H. squamata) DENGAN KEPADATAN DAN JENIS PAKAN YANG BERBEDA", Jurnal Riset Akuakultur, 2012  
Publication <1%

---

20 Angeline Ngantung, Robert Bara, Deiske Sumilat. "Uji Aktivitas Antibakteri dari Spons <1%

Dictyonella funicularis dan Phyllospongia lamellosa yang Diambil pada Perairan Bunaken", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2017

Publication

21

Ria Risti Aatanti. "PENGARUH PENAMBAHAN PROBIOTIK TERHADAP KUALITAS AIR BUANGAN BUDIDAYA UDANG MILIK PT. PULAU MAS KHATULISTIWA (STUDI KASUS: SUNGAI PINYUH, KABUPATEN MEMPAWAH)", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2014

Publication

<1%

22

[www.foodsafetymobile.org](http://www.foodsafetymobile.org)

Internet Source

<1%

23

Submitted to Universitas Mulawarman

Student Paper

<1%

24

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<1%

25

[garuda.ristekdikti.go.id](http://garuda.ristekdikti.go.id)

Internet Source

<1%

26

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1%

27

Wihelmina Dimara, Edwin D Ngangi, Lukas L.J.J Mondoringin. "Evaluasi Lahan Pembudidayaan Rumput Laut di Perairan

<1%

Kampung Sakabu, Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2014

Publication

28

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1%

29

[data.lipi.go.id](http://data.lipi.go.id)

Internet Source

<1%

30

Submitted to Politeknik Negeri Jember

Student Paper

<1%

31

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

<1%

32

Muarif Muarif. "Karakteristik Hidrooseanografi di Perairan Pesisir Kabupaten agam", JURNAL MINA SAINS, 2019

Publication

<1%

33

Komang Iwan Suniada, B. Realino S.. "STUDI PENENTUAN LOKASI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN TELUK SALEH, SUMBAWA, NTB", Jurnal Kelautan Nasional, 2014

Publication

<1%

34

Khairul Syahputra, Didik Ariyanto, Erma Primanita Hayuningtyas, Lamanto Lamanto. "EFEKTIVITAS TRANSFER DAN ANALISIS

<1%

EKSPRESI GEN IMUNOGENIK TAHAN KOI  
HERPES VIRUS (KHV) PADA IKAN MAS  
(*Cyprinus carpio*)", Jurnal Riset Akuakultur,  
2014

Publication

35

[ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

36

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

<1%

37

[mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com](http://mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com)

Internet Source

<1%

38

Yulius Yulius, Aisyah Aisyah, Joko Prihantono,  
Dino Gunawan. "KAJIAN KUALITAS  
PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA LAUT DI  
TELUK SALEH, KABUPATEN DOMPU", Jurnal  
Segara, 2018

Publication

<1%

39

[worldwidescience.org](http://worldwidescience.org)

Internet Source

<1%

40

Glenn Valentino, Abdullah Aman Damai,  
Herman Yulianto. "ANALISIS KESESUAIAN  
PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA IKAN KERAPU  
MACAN (*Epinephelus fuscoguttatu*) DI  
PERAIRAN PULAU TEGAL KECAMATAN  
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN",  
e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya

<1%



41

Agustin Rustam, Ira Dillenia, Rainer A Troa, Dietriech G Bengen. "STUDI AWAL RAJA AMPAT SEBAGAI MARINE ECO ARCHEO PARK: ANALISIS KUALITAS PERAIRAN DI KAWASAN SELAT DAMPIR", Jurnal Segara, 2018

Publication

---

<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Aug-2020 05:34 GMT  
ID: 1365764303  
Word Count: 4148  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
16%	Internet Sources: 11% Publications: 8% Student Papers: 4%

Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor  
Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi By  
Dewi Elfidasari

1% match (Internet from 03-Jan-2018)

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/261/5/LAPPEN\\_Susanti%20Pudji%20Hastuti-Lusiawati%20Dewi\\_Uji%20air%20minum%20\\_BAB%20IV.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/261/5/LAPPEN_Susanti%20Pudji%20Hastuti-Lusiawati%20Dewi_Uji%20air%20minum%20_BAB%20IV.pdf)

1% match (Internet from 21-Feb-2019)

<http://jurnalteknik.janabadra.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/1-Edy-Sriyono.pdf>

1% match (Internet from 09-Jun-2017)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kaunyah/article/download/2700/2072>

1% match (publications)

[Yulizar Yusuf, Hermansyah Aziz, Pepi Rahmi Sari Jaslia. "PENGARUH PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU TERHADAP SIFAT KIMIA AIR RENDAMAN \(pH, TDS DAN KESADAHAN TOTAL\) DAN SIFAT KUAT TEKAN MORTAR SEMEN PCC PADA PERENDAMAN AIR LAUT", Jurnal Zarah, 2017](#)

1% match (Internet from 22-Jan-2019)

<https://lilyutami10.blogspot.com/2015/05/analisa-kuantitatif-mikroba-dengan.html>

1% match (Internet from 16-Mar-2020)

<http://repository.akfar-isfibjm.ac.id/513/1/Sri%20wahyuni.pdf>

1% match (Internet from 17-Jan-2013)

<http://lp2m.uai.ac.id/blog/2012/04/04/identifikasi-jenis-teripang-genus-holothuria-asal-perairan-sekitar-kepulauan-seribu-berdasarkan-perbedaan-morfologi/>

1% match (publications)

[MARIA MAGDALENA KOLO. "Penentuan Status Mutu dan Beban Pencemaran Air Kali Dendeng Kota Kupang", Jurnal Saintek Lahan Kering, 2019](#)

1% match (Internet from 11-Jul-2019)

<https://harry-vht.blogspot.com/2013/05/parameter-kimia-terhadap-perairan-dan.html>

1% match (publications)

[Liss Dyah Dewi Arini, Rahaju Muljo Wulandari. "Kontaminasi Bakteri Coliform pada Saus Siomai dari Pedagang Area Kampus di Surakarta", Biomedika, 2018](#)

< 1% match (publications)

[Rara Diantari, Abdullah Aman Damai, Leoni Dian Pratiwi. "EVALUASI KESESUAIAN PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA IKAN BETUTU Oxyeleotris marmorata \(BLEEKER, 1852\) DI DESA RANTAU JAYA MAKMUR SUNGAI WAY PEGADUNGAN KECAMATAN PUTRA RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018](#)

< 1% match (Internet from 19-Jul-2020)

<https://matildachristinaword.wordpress.com/category/tak-berkategori/>

< 1% match (publications)

[Yonky Dwi Putra, Laili Fitria. "UJI TOKSISITAS AKUT LIMBAH CAIR RUMAH MAKAN TERHADAP IKAN MAS \(Cyprinus Carpio L.\)", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2015](#)

< 1% match (student papers from 25-May-2019)

[Submitted to Universitas Putera Batam on 2019-05-25](#)

< 1% match (Internet from 24-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16503/JURNAL%20TA.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 09-Sep-2018)

<http://taufik-ardiyanto.blogspot.com/2011/07/pencemaran-air.html>

< 1% match (Internet from 06-Feb-2020)

<http://catatanmasrey.blogspot.com/p/analisa-kualitas-lingkungan.html>

< 1% match (publications)

[Bambang Susanto, Ibnu Rusdi, I Nyoman Adiasmara Giri. "OPTIMALISASI PEMELIHARAAN YUWANA ABALON \(H. squamata\) DENGAN KEPADATAN DAN JENIS PAKAN YANG BERBEDA", Jurnal Riset Akuakultur, 2012](#)

< 1% match (publications)

[Angeline Ngantung, Robert Bara, Deiske Sumilat. "Uji Aktivitas Antibakteri dari Spons Dictyonella funicularis dan Phyllosporgia lamellosa yang Diambil pada Perairan Bunaken", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2017](#)

< 1% match (publications)

[Ria Risti Aatanti. "PENGARUH PENAMBAHAN PROBIOTIK TERHADAP KUALITAS AIR BUANGAN BUDIDAYA UDANG MILIK PT. PULAU MAS KHATULISTIWA \(STUDI KASUS: SUNGAI PINYUH, KABUPATEN MEMPAWAH\)", Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 2014](#)

< 1% match (student papers from 20-Jun-2019)

[Submitted to Lambung Mangkurat University on 2019-06-20](#)

< 1% match (Internet from 05-Dec-2019)

[http://www.foodsafetymobile.org/UserFiles/Portfolio/37\\_%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20PDF%20%E0%B8%99%E0%B8%A1%](http://www.foodsafetymobile.org/UserFiles/Portfolio/37_%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20PDF%20%E0%B8%99%E0%B8%A1%)

< 1% match (Internet from 24-Jul-2019) <a href="http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/524?issue=+Vol+9%2C+No+1+%282017%29%3A+Edisi+Januari">http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/524?issue=+Vol+9%2C+No+1+%282017%29%3A+Edisi+Januari</a>
< 1% match (student papers from 25-Jul-2017) <a href="#">Submitted to Universitas Warmadewa on 2017-07-25</a>
< 1% match (student papers from 28-Apr-2020) <a href="#">Submitted to Universitas Mulawarman on 2020-04-28</a>
< 1% match (student papers from 26-Feb-2020) <a href="#">Submitted to Sultan Agung Islamic University on 2020-02-26</a>
< 1% match (Internet from 10-Aug-2018) <a href="http://digilib.uinsby.ac.id/26607/7/Muhammad%20Chusnan%20Ma%27arif_H94214022.pdf">http://digilib.uinsby.ac.id/26607/7/Muhammad%20Chusnan%20Ma%27arif_H94214022.pdf</a>
< 1% match (Internet from 12-Mar-2020) <a href="https://data.lipi.go.id/file.xhtml?fileId=17171">https://data.lipi.go.id/file.xhtml?fileId=17171</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Wihelmina Dimara, Edwin D Ngangji, Lukas L.J.J Mondoringin. "Evaluasi Lahan Pembudidayaan Rumput Laut di Perairan Kampung Sakabu, Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2014</a>
< 1% match (Internet from 20-Jul-2020) <a href="https://mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com/2015/10">https://mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com/2015/10</a>
< 1% match (Internet from 13-Apr-2019) <a href="https://adoc.tips/analisis-polimorfisme-gen-nramp-.html">https://adoc.tips/analisis-polimorfisme-gen-nramp-.html</a>
< 1% match (Internet from 18-Sep-2019) <a href="http://repository.unpas.ac.id/43617/7/BAB%20II.pdf">http://repository.unpas.ac.id/43617/7/BAB%20II.pdf</a>
< 1% match (Internet from 18-May-2016) <a href="http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijms/article/download/9616/pdf_1">http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijms/article/download/9616/pdf_1</a>
< 1% match (Internet from 29-Jul-2020) <a href="https://worldwidescience.org/topicpages/f/forragem+consumida+por.html">https://worldwidescience.org/topicpages/f/forragem+consumida+por.html</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Yulius Yulius, Aisyah Aisyah, Joko Prihantono, Dino Gunawan. "KAJIAN KUALITAS PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA LAUT DI TELUK SALEH, KABUPATEN DOMPU", Jurnal Segara, 2018</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Muarif Muarif. "Karakteristik Hidrooseanografi di Perairan Pesisir Kabupaten agam", JURNAL MINA SAINS, 2019</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Komang Iwan Suniada, B. Realino S.. "STUDI PENENTUAN LOKASI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN TELUK SALEH, SUMBAWA, NTB", Jurnal Kelautan Nasional, 2014</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Khairul Syahputra, Didik Ariyanto, Erma Primanita Hayuningtyas, Lamanto Lamanto. "EFEKTIVITAS TRANSFER DAN ANALISIS EKSPRESI GEN IMUNOGENIK TAHAN KOI HERPES VIRUS (KHV) PADA IKAN MAS (Cyprinus carpio)", Jurnal Riset Akuakultur, 2014</a>
< 1% match (student papers from 04-Feb-2019) <a href="#">Submitted to Lambung Mangkurat University on 2019-02-04</a>
< 1% match (student papers from 02-Jul-2018) <a href="#">Submitted to Politeknik Negeri Jember on 2018-07-02</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Agustin Rustam, Ira Dillenia, Rainer A Troa, Dietrieche G Bengen. "STUDI AWAL RAJA AMPAT SEBAGAI MARINE ECO ARCHEO PARK: ANALISIS KUALITAS PERAIRAN DI KAWASAN SELAT DAMPIR", Jurnal Segara, 2018</a>
< 1% match (publications) <a href="#">Glenn Valentino, Abdullah Aman Damaj, Herman Yulianto. "ANALISIS KESESUAIAN PERAIRAN UNTUK BUDIDAYA IKAN KERAPU MACAN (Epinephelus fuscoguttatu) DI PERAIRAN PULAU TEGAL KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN", e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan, 2018</a>

Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi Dewi Elfidasari<sup>1</sup>, Nita Noriko<sup>2</sup>, Yunus Effendi<sup>3</sup>, Riris Lindiawati Puspitasari<sup>4</sup> 1, 2, 3, 4 [Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110 Penulis untuk korespondensi/ E-mail: \[d\\\_elfidasari@uai.ac.id\]\(mailto:d\_elfidasari@uai.ac.id\)](#)  
**Abstrak** - Situ Lebak Wangi merupakan situ yang berada di daerah Bogor, dan awalnya dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air saat musim hujan untuk meningkatkan persediaan air tanah. Saat ini, Situ Lebak Wangi dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan kualitas baik fisik, kimia dan biologi perairan situ. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas fisik, kimia dan biologi perairan Situ Lebak Wangi agar diperoleh informasi mengenai kualitas perairannya sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat di sekitarnya nilai penting konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan situ tersebut. Hasil pengukuran sifat fisik dan kimia air menunjukkan bahwa suhu di perairan Situ Lebak Wangi masih memenuhi baku mutu air kelas 1, nilai total padatan terlarut perairan Situ masih di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan, nilai kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 67,17 – 80,83 cm dengan nilai rata-rata 74,46 cm, nilai pH perairan danau lebih rendah dari perairan sungai, yaitu berkisar antara 6,60–8–80. Pengukuran DO menunjukkan bahwa di perairan danau konsumsi oksigennya lebih tinggi, sedangkan hasil BOD5 menunjukkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi sudah tercemar oleh bahan organik mudah urai (BOD5). Nilai daya hantar listrik berkisar antara 112,0 – 118,0  $\mu$ hos/cm. Hasil analisa kualitas air Situ Lebak Wangi secara keseluruhan menunjukkan bahwa perairan tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai air baku, karena mengandung bakteri patogen Salmonella-Shigella yang merupakan penyebab thypus dan kolera. Keata Kunci - kualitas fisik, kimia dan biologi; Situ Lebak Wangi; Perairan; Baku mutu air Abstract - Situ Lebak Wangi is a place located in the Bogor area, and was originally used as a water reservoir during the rainy season to increase groundwater supply. Currently, Situ Lebak Wangi is used as a waste disposal site by the community. This can lead to changes in the quality of both physical, chemical and biological waters there. Therefore, research on the physical,

chemical and biological qualities of waters of Situ Lebak Wangi [to obtain information about the quality of the](#) waters so that it can be socialized to the community around the importance of conservation, management and utilization of the site. [The result of measurement of physical and chemical](#) properties of [water](#) shows that the temperature in Situ Lebak Wangi waters still meet the water quality standard class 1, the total dissolved solids of waters Situ is still below the required quality standard threshold, the brightness value in Situ Lebak Wangi waters ranges between 67, 17 - 80.83 cm with an average rating of 74.46 cm, the pH value of the lake waters lower than river waters, which ranged from 6.60-8-80. Measurements of DO indicate that in lake waters oxygen consumption is higher, whereas BOD5 results show that waters Situ Lebak Wangi already contaminated by organic material easily explained (BOD5). The electrical conductivity values range from 112.0 - 118.0 phos / cm. The result of Situ Lebak Wangi water quality analysis as a whole shows that the water is not feasible to serve as raw water, because it contains Salmonella-Shigella pathogen bacteria which is the cause of thypus and cholera. Keywords - physical quality, chemistry and biology, Situ Lebak Wangi, Waters, Water quality standards s PENDAHULUAN itu Lebak Wangi merupakan salah satu situ yang berada di daerah Bogor. Situ ini awalnya dimanfaatkan [sebagai tempat penampungan air](#) di [saat musim hujan dan sebagai](#) peningkatan ketersediaan [air tanah](#). Situ Lebak Wangi juga dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan limbah oleh masyarakat. Akibat dari pemanfaatan yang berlebihan dan pengelolaan yang kurang tepat Situ Lebak Wangi saat ini mengalami pendangkalan karena dijadikan perumahan dan lahan pertanian (Sriyono, 2013). Survei awal memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar situ berupa bertambahnya jumlah rumah, area pertanian, restoran dan bengkel serta budidaya perikanan dengan karamba. Selain itu, terjadi pula kemerosotan debit air akibat sedimentasi. Adanya aktivitas masyarakat di Situ Lebak Wangi diduga menyebabkan terjadinya perubahan kualitas baik fisik, kimia dan biologi pada perairan situ. Perubahan tersebut disebabkan adanya masukan beban dari limbah senyawa organik dan non organik, serta kontaminasi dari septic tank rumah warga sekitar Situ Lebak Wangi yang umumnya mengandung bakteri patogen, khususnya kandungan bakteri total koli dan E.coli (fecal coli) dan dapat membahayakan kesehatan. Masuknya limbah juga dapat menyebabkan blooming algae dan mengubah faktor fisik dan kimia lingkungan perairan. Perubahan kualitas perairan tersebut menyebabkan penurunan kualitas perairan tersebut tidak sesuai lagi dengan air baku kelas 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan pengujian secara fisik kimia dan biologi pada air di perairan Situ Lebak Wangi untuk menentukan [kualitas air di perairan tersebut](#). [Penelitian ini bertujuan menentukan kualitas](#) fisik, kimia [dan biologi air](#) perairan Situ Lebak Wangi berdasarkan [Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Manfaat yang dapat diberikan berupa informasi mengenai kualitas air di Situ Lebak Wangi kepada masyarakat di sekitar kawasan tersebut sehingga dapat dipertimbangkan cara pengelolaan dan pemanfaatan situ tersebut. TINJAUAN PUSTAKA [Situ merupakan daerah cekungan](#) seperti danau [yang dapat menampung air](#). Tidak hanya [sebagai sumber air, situ juga berfungsi sebagai pengendali banjir, sebagai resapan untuk meningkatkan ketersediaan air tanah](#) dan perikanan. Pemanfaatan [situ](#) secara tidak langsung [juga](#) telah dilakukan, [yaitu](#) sebagai tempat [pariwisata dan rekreasi](#) (Yazwar, 2009). Situ Lebak Wangi adalah salah satu yang berada di daerah Bogor (Gambar 1). Situ ini terletak [di Desa Pamegarsari RT 02/01, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat](#). Pemanfaatan yang berlebihan dan pengelolaan yang kurang baik membuat keadaan Situ Lebak Wangi memprihatinkan (Sriyono, 2013). Gambar 1. Situ Lebak Wangi (dok.Pribadi, 2014). Faktor Fisik-Kimia Perairan Suhu [Pengukuran suhu merupakan parameter yang penting dalam perairan](#). Menurut hukum [Van't Hoff's kenaikan suhu sebesar 10°C pada kisaran suhu yang masih ditolerir akan meningkatkan aktivitas fisiologis dari suatu](#) organisme [meningkat 2-3 kali lipat](#) (Barus, 2004). Suhu pada perairan disebabkan oleh intensitas cahaya matahari, kanopi dari vegetasi sekitar perairan serta pertukaran panas antara air dengan udara di sekitarnya. Kisaran suhu untuk organisme perairan adalah sekitar 20-30°C (Sitorus, 2009). [Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan kelarutan](#) oksigen menurun di [dalam air](#) (Haslam, 1995). [Derajat Keasaman \(pH\) Derajat keasaman merupakan salah satu faktor](#) pembatas suatu perairan. Perairan umumnya memiliki kisaran tertentu untuk hidup yaitu, netral atau berada pada keadaan asam lemah hingga basa lemah (pH 7-8,5). Semakin rendah pH suatu perairan maka semakin tinggi mobilitas logam berat, sedangkan semakin tinggi pH perairan [menyebabkan keseimbangan ammonium dan ammoniak dalam air terganggu](#) (Barus, 2001). Kandungan Oksigen Terlarut ([DO](#)) [Kandungan oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut penting bagi organisme perairan terutama respirasi. Proses fotosintesis dari fitoplankton yang menghasilkan oksigen dan difusi dari udara akan mempengaruhi kandungan oksigen terlarut. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan oksigen adalah suhu, laju fotosintesis dan adanya zat pencemar lainnya. Konsentrasi oksigen menurun seiring dengan kenaikan suhu dan meningkat seiring dengan penurunan suhu \(Barus, 2001\). Kebutuhan Oksigen Biologis \(BOD5\) dan Kebutuhan Oksigen Kimiawi \(COD\) Kebutuhan oksigen biologis atau Biological Oxygen Demand \(BOD\) merupakan jumlah oksigen yang diperoleh suatu mikroorganisme aerobik dalam penguraian senyawa organik, yang diukur pada suhu 20°C. Berdasarkan hasil penelitian, proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dapat dilakukan selama 5 hari dengan persentase senyawa organik yang diuraikan mencapai kurang lebih 70%, sehingga pengukuran yang umum dilakukan adalah pengukuran selama 5 hari \(BOD5\) \(Barus, 2001\). Pengukuran BOD didasarkan kepada kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik, artinya hanya terdapat substansi yang mudah diuraikan secara biologis seperti senyawa yang umumnya terdapat dalam limbah rumah tangga \(Barus, 2001\). Menurut Brower et al. \(1990\), nilai konsentrasi BOD menunjukkan suatu kualitas perairan yang masih tergolong baik dimana apabila konsumsi O<sub>2</sub> selama periode 5 hari sampai 5 mg/l O<sub>2</sub>, dan apabila konsumsi O<sub>2</sub> berkisar antara 10 mg/l - 20 mg/l, maka tingkat pencemaran oleh materi organik tinggi dan untuk air limbah nilai BOD umumnya lebih besar dari 100 mg/l. \[Kebutuhan oksigen kimiawi\]\(#\) atau \[Chemical Oxygen Demand \\(COD\\) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan\]\(#\) dalam proses oksidasi limbah dalam air melalui reaksi kimia \(Wardhana, 2004\). Perairan yang memiliki nilai COD kurang dari 20mg/L termasuk perairan tidak tercemar. Nilai COD untuk perairan yang tercemar yaitu, \[lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industry dapat mencapai 60.000 mg/L\]\(#\) \(Effendi, 2003\). Total Padatan Terlarut \(TDS\) Total padatan terlarut atau Total Dissolved Solid \(\[TDS\]\(#\)\) \[merupakan bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring milipore dengan pori 0,45 µm\]\(#\) \(Sitorus, 2009\). \[Padatan ini\]\(#\) dapat berupa \[senyawa-senyawa anorganik dan organik yang terlarut dalam air, mineral dan garam-garamnya\]\(#\). Nilai \[TDS\]\(#\) berhubungan dengan kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan merupakan kemampuan penetrasi cahaya matahari hingga kedalaman tertentu. Nilai ini penting untuk mengetahui kedalaman tertentu air yang memungkinkan terjadinya proses fotosintesis \(Suin, 2002\). Faktor Biologi Perairan Plankton Plankton merupakan organism baik tumbuhan maupun hewan yang hidup secara mengapung, mengambang atau melayang di dalam air. Plankton memiliki kemampuan renang yang terbatas sehingga selalu terbawa oleh arus air \(Nontji 2006\). Distribusi plankton sangat dipengaruhi oleh dayagerak air, seperti arus dan lainnya \(Nybakken 1992\). Secara fungsional membagi plankton atas empat jenis. Zooplankton atau disebut juga plankton hewani yang umumnya berukuran 0,2-2mm. Jenis plankton ini bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Keberadaannya dipengaruhi oleh fitoplankton sebagai makanannya. Fitoplankton atau dikenal sebagai plankton nabati. Plankton berukuran 2-200µm dan bersifat fotoautotrof. Fitoplankton merupakan produsen pada ekosistem \[perairan. Bakterioplankton merupakan bakteri yang hidup sebagai plankton\]\(#\). Berukuran < 1µm, tidak berklorofil dan berperan sebagai daur hara dalam ekosistem perairan. Jenis plankton yang terakhir adalah virioplankton, berukuran < 0,2µm. Virioplankton menjadikan biota plankton lain sebagai inangnya \(Nontji, 2006\). Plankton dalam perairan memegang peranan penting selain sebagai produsen utama. Plankton juga dapat dijadikan sebagai bioindikator atau penentuan kualitas perairan karena plankton mempunyai lingkungan hidup yang sempit dan merespon dengan cepat saat terjadi perubahan pada lingkungan. Salah satu contoh jenis plankton yang menjadi bioindikator terjadinya eutrofikasi adalah Mycrocystis \(Belinger&Sige, 2010\). Coliform \[Coliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan dan produk-produk susu. Coliform\]\(#\) sebagai suatu kelompok bakteri dicirikan sebagai bakteri \[berbentuk batang, Gram negatif, tidak\]\(#\) membentuk spora, aerobik \[dan\]\(#\) anaerobik fakultatif yang \[memfermentasi laktosa\]\(#\) dengan \[menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35°C. Adanya bakteri Coliform di dalam\]\(#\) makanan \[/minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan\]\(#\) \(Suriawiria, 2008\) Bakteri Coliform dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, fekal dan non fekal. Diantaranya kelompok fekal ini adalah E. coli. \[E. coli merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau manusia\]\(#\) \(Irianto, 2006\). Keberadaan E \[coli pada air\]\(#\) menunjukkan bahwa \[air tersebut\]\(#\) pernah \[terkontaminasi feses dan\]\(#\)](#)

[mungkin](#) dapat [mengandung patogen usus](#) (Servals dan Pierre, 2007). Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan bakteri E.coli harus nol dalam 100 ml. Kelompok Coliform non-fekal diantaranya, Enterobacter aerogenes (Suriawiria, 2008). Penentuan Jumlah Coliform Jumlah Coliform dalam pemeriksaan kualitas air dapat diketahui menggunakan metode MPN ([Most Probable Number](#)). Metode MPN menggunakan [medium cair di dalam tabung reaksi](#), dimana [perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif yang ditumbuhi oleh jasad renik setelah diinkubasi pada suhu tertentu. Pengamatan tabung positif](#) terbaik yaitu untuk jasad renik pembentuk gas. Setiap perlakuan [pada umumnya digunakan tiga atau lima seri tabung. Lebih banyak tabung yang digunakan menunjukkan ketelitian yang lebih tinggi](#) (Pelzcar dan Chan, 1988). METODE PENELITIAN dilakukan pada bulan Desember 2014 di Situ Lebak Wangi – Parung Kabupaten Bogor. Pembuatan bahan percobaan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Prodi Biologi Universitas Al- Azhar Indonesia. Pengambilan sampel air danau dilakukan di 6 titik saat pagi hari (pukul 07.00 – 09.00) dengan 3 ulangan. Posisi pengambilan sampel air ditandai dengan menggunakan alat GPS. Pengambilan sampel menggunakan botol winkler. Botol dimasukkan perlahan [ke dalam air. Posisi mulut botol](#) berlawanan [dengan](#) arah [aliran air sehingga air](#) dapat [masuk ke dalam botol](#) tanpa adanya gelembung udara. Botol disimpan dan diberi label untuk analisa fisika dan kimia air danau. Sampel untuk analisis mikroba dilakukan dengan cara mengambil langsung air danau ke dalam botol sampel steril dan segera ditutup rapat lalu disimpan di cool box. Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia Sampel air yang disimpan di Botol Winkler segera diukur [oksigen terlarut dengan DO meter](#), suhu air [dengan](#) termometer, nilai [pH dengan pH meter](#) digital, zat padat [terlarut dengan](#) TDS [meter, dan](#) daya hantar listrik dengan Conductivity meter. Kecerahan air danau dan intensitas cahaya diukur langsung di danau dengan cakra Secchi dan lux meter. Kebutuhan oksigen biokimia (BOD) diukur dengan menghitung selisih nilai DO setelah 5 hari penyimpanan pada suhu 40C. Pembuatan Media Media dibuat sesuai takaran yang tertera di botol untuk media Plate Count Agar (PCA), Mc Conkey Agar, Escherichia coli Mug Agar, Salmonella-Shigella Agar (SSA), Potatoe Dextrose Agar (PDA) Media tersebut dilarutkan dalam akuades dan dipanaskan dengan menggunakan penangas air sampai homogen. Kemudian semua media, kecuali SSA, disterilisasi dengan menggunakan [autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit](#). Setelah itu, [media dituang ke dalam cawan petri](#) dan dibiarkan memadat. Pengukuran Kualitas Mikrobiologi Sampel air danau dari ke-6 titik [dicerikan dengan menggunakan larutan fisiologis \(NaCl 0,85%\)](#), hingga pengenceran ke-10. Setelah itu, sebanyak 0,1 ml diinokulasikan ke media uji dan disebar secara merata dengan menggunakan batang L. Setelah itu, diinkubasi di suhu ruang selama 24 jam dan dihitung jumlah koloninya untuk mengetahui jumlah total mikroba. Khusus untuk pengukuran bakteri Salmonella-Shigella, pengenceran yang ditanam adalah ke-0 sampai dengan ke-3. HASIL DAN PEMBAHASAN Kualitas Fisika dan Kimia Air Suhu air Hasil pengukuran suhu [pada lokasi penelitian secara keseluruhan tidak memperlihatkan variasi yang besar, bahkan relatif stabil yaitu berkisar antara](#) 29,2–30,2 0C, dengan nilai rata-rata 29,6 0C (Gambar 3). Melihat keadaan suhu di daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi suhu di perairan Situ Lebak Wangi masih memenuhi baku mutu air kelas 1. Dengan demikian, perairan Situ Lebak Wangi dapat digunakan sebagai sumber air baku air minum. Suhu air mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan biota perairan, terutama dalam proses metabolisme. Kenaikan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, namun di lain pihak juga mengakibatkan turunnya kelarutan oksigen dalam air. Oleh karena itu, maka pada kondisi tersebut organisme akuatik seringkali tidak mampu memenuhi kadar oksigen terlarut untuk keperluan proses metabolisme dan respirasi (Effendi, 2003). Gambar 2. Sebaran nilai rata-rata suhu di perairan Situ Lebak Wangi. Zat Padat Terlarut (TDS) Hasil pengukuran total padatan terlarut (TDS) di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 53,67 – 58,67 mg/l dengan rata-rata 56,78 mg/l (Gambar 4). [Baku mutu kualitas air kelas 1](#) berdasarkan [PP No. 82 tahun 2001 untuk](#) total padatan terlarut maksimum 1000 mg/l. Nilai total padatan terlarut perairan danau masih di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan. Dengan demikian, perairan Situ Lebak Wangi masih layak digunakan sebagai sumber air baku air minum. Gambar 3. Sebaran nilai rata-rata zat padat terlarut (TDS) di perairan Situ Lebak Wangi. Kecerahan air Nilai kecerahan suatu perairan berhubungan [erat dengan penetrasi cahaya matahari ke](#) dalam badan [air. Cahaya](#) matahari akan membantu proses terjadinya fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen terlarut yang merupakan faktor penting dalam kehidupan akuatik. Nilai kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 67,17 – 80,83 cm dengan nilai rata-rata 74,46 cm (Gambar 5). Nilai kecerahan antar stasiun penelitian mempunyai variasi yang relatif kecil dan hampir menyebar merata pada setiap stasiun. Adanya perbedaan nilai kecerahan ini diduga karena pengaruh dari kuantitas maupun kualitas air dari daerah aliran sungai yang membawa partikel-partikel bahan organik ke perairan danau. Gambar 4. Sebaran nilai rata-rata kecerahan di perairan Situ Lebak Wangi. pH air [Hasil pengukuran pH di perairan](#) Situ Lebak Wangi [memperlihatkan bahwa nilai pH](#) perairan danau lebih rendah dari perairan sungai, yaitu berkisar antara 6,60–8,80, dengan nilai rata-rata 7,82 (Gambar 5). Hal ini diduga akibat adanya pengaruh buangan limbah penduduk yang masuk ke perairan danau. Limbah atau sampah tersebut mengandung berbagai macam senyawa kimia yang bersifat basa seperti buangan deterjen, yang dapat meningkatkan nilai pH di perairan. Namun demikian, secara keseluruhan pH perairan danau masih berada pada kisaran yang aman sebagai sumber air baku air minum berdasarkan ambang batas baku mutu kualitas air kelas 1 yang mensyaratkan nilai pH antara 6–9. Dengan demikian, pH perairan Situ Lebak Wangi dapat mendukung kehidupan yang ada di dalamnya dan dapat dipergunakan sebagai sumber air baku air minum. [Gambar 5. Sebaran nilai rata-rata pH di perairan](#) Situ Lebak Wangi. [Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen dan ion-ion.](#) Dari aktivitas biologi dihasilkan gas CO<sub>2</sub> yang merupakan hasil respirasi. Gas ini akan membentuk ion buffer atau penyangga untuk menjaga kisaran pH di perairan agar tetap stabil (Pescod, 1978). Kelarutan Oksigen (DO) [Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut di perairan](#) Situ Lebak Wangi [berkisar antara 4, 81 – 6, 20 mg/l, dengan nilai rata-rata 5, 28 mg/l](#) (Gambar 6). Hal ini menunjukkan bahwa di perairan danau konsumsi oksigennya lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik yang berasal dari kegiatan di badan perairan danau, terutama kegiatan budidaya ikan dan sampah atau sisa makanan. Kandungan oksigen terlarut di perairan danau tidak melebihi baku mutu air kelas 1 sebagai sumber air baku air minum yang mensyaratkan kandungan oksigen terlarut > 6 mg/l. Kandungan oksigen terlarut ini memberikan gambaran bahwa secara umum perairan danau sudah mulai tercemar oleh bahan organik yang mudah terurai karena nilainya sudah mendekati baku mutu. Hal ini menunjukkan bahwa perairan danau Situ Lebak Wangi layak digunakan sebagai sumber air baku air minum. Penyebab kandungan oksigen terlarut di titik sampling 1 di atas ambang batas baku mutu diduga karena padatnya pemanfaatan lahan pada ekosistem perairan danau terutama untuk pertanian, sehingga dekomposisi bahan organik menjadi bahan anorganik oleh mikroorganisme pengurai juga semakin meningkat. Selain itu, menurunnya kandungan [oksigen terlarut ini juga disebabkan](#) oleh banyaknya [limbah organik yang](#) berasal [dari](#) limbah domestik dari daerah sempadan danau. Gambar 6. Sebaran nilai rata-rata kandungan oksigen terlarut di perairan Situ Lebak Wangi. BOD<sub>5</sub> BOD<sub>5</sub> merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberadaan bahan organik di perairan. Hal ini disebabkan BOD<sub>5</sub> dapat menggambarkan jumlah bahan organik yang dapat diuraikan secara biologis, yaitu [jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecahkan atau mengoksidasi bahan-bahan organik menjadi karbondioksida dan air](#). Nilai BOD<sub>5</sub> yang tinggi [menunjukkan semakin besarnya bahan organik yang terdekomposisi menggunakan sejumlah oksigen di perairan](#). Adapun sebaran nilai rata-rata BOD<sub>5</sub> di perairan Situ Lebak Wangi diperlihatkan pada Gambar 7. Gambar 7 mempresentasikan bahwa [nilai BOD<sub>5</sub> di](#) perairan danau [berkisar antara 1 ,6- 3,1 mg/l](#), dengan rata-rata 2,4 mg/l. Berdasarkan baku mutu air kelas 1, nilai BOD<sub>5</sub> yang dipersyaratkan < 2 mg/l. Dengan demikian, disimpulkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi sudah tercemar oleh bahan organik mudah urai (BOD<sub>5</sub>) dan tidak layak dipergunakan sebagai sumber air baku air minum. Tingginya kadar BOD<sub>5</sub> tersebut terutama disebabkan oleh padatnya pemanfaatan areal di sekitar sungai untuk permukiman penduduk. Hal ini akan mengintroduksi limbah domestik masuk ke perairan danau. Gambar 7. Sebaran nilai rata-rata BOD<sub>5</sub> di perairan Situ Lebak Wangi. Pada perairan yang relatif tenang (stagnant) seperti Situ Lebak Wangi, limbah organik yang masuk dimungkinkan akan mengendap dan terakumulasi pada substrat dasar perairan, sehingga proses dekomposisi meningkat dan menyebabkan kandungan oksigen terlarut menurun. [Hal ini sesuai dengan pendapat](#) Anggoro (1996) [yang menyatakan bahwa](#) menumpuknya bahan pencemar organik di perairan akan menyebabkan proses dekomposisi oleh organisme pengurai juga semakin meningkat, sehingga konsentrasi BOD<sub>5</sub> juga meningkat. Di samping itu menurut Canter and Hill (1979), peningkatan nilai BOD<sub>5</sub> merupakan indikasi menurunnya kandungan oksigen terlarut di perairan karena adanya aktivitas organisme pengurai. [Daya Hantar Listrik](#) (Conductivity) Untuk [nilai daya hantar listrik](#) (Conductivity), kondisi [air](#) danau Situ Lebak Wangi yang diteliti sebanding dengan kandungan TDS yang mana pada tingkat nilai TDS tinggi, nilai daya hantar listrik juga tinggi (Gambar 8). Hasil pengukuran daya hantar

listrik di perairan Situ Lebak Wangi berkisar antara 112,0 – 118,0  $\mu\text{hos/cm}$ , dengan nilai rata-rata rata-rata 114,6  $\mu\text{hos/cm}$ . Dalam hal ini tidak ada acuan mengenai persyaratan baku mutu yang ditentukan. Daya hantar listrik sendiri merupakan gambaran mengenai [banyaknya kandungan garam-garam terlarut yang mana semakin tinggi ion-ion garam-garam yang ada akan semakin efektif sebagai konduktor dalam mengantarkan arus listrik](#). coliform melalui air, terutama penyakit perut seperti tipus, kolera dan disentri (Suriawiria, 1993). Hasil analisis kandungan bakteri coliform di perairan danau berkisar antara  $1 \times 10^4 - 1 \times 10^7$  cfu/ml, yang menunjukkan bahwa perairan Situ Lebak Wangi mengandung bahan organik yang cukup tinggi sebagai sumber kehidupan mikroorganisme. Suriawiria (1993) menyatakan bahwa Gambar 8. Sebaran nilai rata-rata daya hantar kehadiran mikroba patogen di dalam air akan listrik di perairan Situ Lebak Wangi. meningkat jika kandungan bahan organik di dalam air cukup tinggi, yang berfungsi sebagai Kualitas Mikrobiologi tempat dan sumber kehidupan Bakteri coliform dapat digunakan sebagai mikroorganisme. Kualitas air Situ Lebak indikator adanya pencemaran fekes atau Wangi secara keseluruhan tidak layak untuk kotoran manusia dan hewan di dalam perairan. dijadikan sebagai air baku, didukung oleh hasil Golongan bakteri ini umumnya terdapat di penelitian yang memperlihatkan adanya jenis dalam fekes manusia dan hewan. Oleh sebab bakteri patogen Salmonella- Shigella yang itu keberadaannya di dalam air tidak merupakan penyebab tifus dan kolera. dikehendaki, baik ditinjau dari segi kesehatan, estetika, kebersihan maupun kemungkinan terjadinya infeksi yang berbahaya. Beberapa jenis penyakit dapat ditularkan oleh bakteri Tabel 1. Analisis mikroba perairan Situ Lebak Wangi. Total Titik sampling 1 2 3 4 5 Rata-rata Baku mutu (CFU/ml) Bakteri (CFU/ml) E.coli (CFU/ml) Coliform (CFU/ml) SS (CFU/ml) Jamur (propagul/ml)  $1 \times 10^6$   $3.3 \times 10^3$   $1 \times 10^3$   $1 \times 10^5$   $3.3 \times 10^3$   $1.1 \times 10^2$   $1 \times 10^6$   $8.8 \times 10^5$   $1 \times 10^7$   $8.8 \times 10^5$   $1.6 \times 10^2$   $1 \times 10^4$   $1 \times 10^3$   $1 \times 10^4$   $1 \times 10^3$   $1.8 \times 10^2$   $1 \times 10^4$   $1 \times 10^3$   $4.5 \times 10^1$   $2 \times 10^{12}$   $4.9 \times 10^5$   $1.4 \times 10^5$   $4.9 \times 10^5$   $2.5 \times 10^2$   $4 \times 10^{11}$   $2.8 \times 10^5$   $2.1 \times 10^6$   $2.8 \times 10^5$   $1.5 \times 10^2$   $1 \times 10^3$   $0$   $1 \times 10^3$   $0$  - Fitoplankton Hasil peamatan fitoplankton yang dilakukan didapatkan bahwa pada setiap stasiun diperoleh jumlah jenis yang berbeda. Stasiun 1 ditemukan 15 jenis fitoplankton, sedangkan stasiun 2, 3 dan 4 ditemukan 9, 22 dan 14. Plankton dalam perairan memegang peranan penting selain sebagai produsen utama. Plankton juga dapat dijadikan sebagai bioindikator atau penentuan kualitas perairan karena plankton mempunyai lingkungan hidup yang sempit dan merespon dengan cepat saat terjadi perubahan pada lingkungan. Salah satu contoh jenis plankton yang menjadi bioindikator terjadinya eutrofikasi adalah Myrcocystis (Belinger&Sige, 2010). KESIMPULAN Berdasarkan pengukuran kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi, perairan Situ Lebak Wangi tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. UCAPAN TERIMA KASIH Dana penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pengembangan dan Penelitian (LP2M) Universitas Al Azhar Indonesia. REFERENCE [1] Barus, T.A. 2001. Pengantar Limnologi: Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan IPA. Universitas Sumatera Utara. Medan. [2] Barus, T.A. 2004. Pengantar Limnologi: Studi Tentang Ekosistem Sungai dan Danau. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan IPA. Universitas Sumatera Utara. Medan. [3] Brower, J.E., Jerrold, H.Z. & Car, I.N.V.E. 1990. Field and Laboratory Methods for General Ecology 3th Edition. Wm. C. Brown Publisher. New York. [4] Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius, Yogyakarta. [5] Fardiaz, S. 1993. Analisis Mikrobiologi Pangan. PAU. IPB. [6] Haslam, S.M. 1995. River Pollution, An Ecological Perspective. Belhaven Press. London. [7] Irianto, K. 2006. Mikrobiologi: Menguak Dunia Mikroorganisme. Yrama Widya. Bandung. [8] Pelczar, M. J. & E. C. S. Chan. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi. Diterjemahkan oleh : Hadioetomo, R. S., T. Imas, S. S. Tjitrosomo dan S. L. Angka. UI Press. Jakarta. [9] Servais& Pierre. 2007. Fecal Bacteria In The Rivers Of The Seine Drainage Network (France): Sources, Fate and Modeling. Université Libre de Bruxelles. Bruxelles. [10] Sitorus, M. 2009. Hubungan Nilai Produktivitas Primer Dengan Konsentrasi Klorofil a dan Faktor Fisik Kimia Di Perairan Danau Toba, Balige, Sumatera Utara. Tesis. Program Studi Biologi. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. [11] Sriyono, E. 2013. Penelusuran Banjir dan Kapasitas Pelimpah Situ Lebak Wangi, Bogor Jawa Barat. Jurnal Teknik. 2(3): 84-91. [12] Suin, N. M. 2002. Metode Ekologi. Universitas Andalas. Padang. [13] Suriawiria, U. 2008. Mikrobiologi Air. PT. Alumni. Bandung. [14] Wardhana, W.A. 2004. Dampak Pencemaran Perairan, Penerbit Andi, Yogyakarta. [15] Yazwar. 2008. Keanekaragaman Plankton Berdasarkan dan Keterkaitannya Dengan Kualitas Air Di Prapat Danau Toba. Tesis. Program Studi Biologi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. 104 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015 105 106 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015 107 108 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015 109 110 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015 111 112 Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI, Vol. 3, No. 2, September 2015